

USO EFICIENTE DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS.

MINIMIZACIÓN DE FITOSANITARIOS DE SÍNTESIS QUÍMICA

DOQ PRIORAT

25 DE JUNIO 2020



MEJORA DE LA
SOSTENIBILIDAD VITIVINÍCOLA
DE LA COMARCA DEL PRIORAT

LIFE15 ENV/ES/000399




B2. USO EFICIENTE DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS. MINIMIZACIÓN DE FITOSANITARIOS DE SÍNTESIS QUÍMICA

OBJETIVO:


- La minimización de la lucha tradicional con insecticidas mediante la técnica de Confusión Sexual.
- Los difusores se deben colocar de acuerdo con la dosis y diseño que indique la casa comercial, y analizar si es necesario el reforzar la zona perimetral de las laderas.
- El método requiere realizar controles y observaciones en campo sobre la evolución de la plaga, por si fuese necesario complementar, con algún otro tratamiento, aunque no suele ser necesario.

B2. USO EFICIENTE DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS. MINIMIZACIÓN DE FITOSANITARIOS DE SÍNTESIS QUÍMICA


EVOLUCIÓN HAS. CONFUSIÓN SEXUAL
13/19



EVOLUCIÓN HAS. CONFUSIÓN SEXUAL
(LIFE Priorat+Montsant)



B2. USO EFICIENTE DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS. MINIMIZACIÓN DE FITOSANITARIOS DE SÍNTESIS QUÍMICA




Datos año: 2019



PRIORAT
DENOMINACIÓ D'ORIGEN QUALIFICADA

PARCELAS EN CONFUSIÓN SEXUAL
D.O.Q. PRIORAT



Datos año: 2019

B2. USO EFICIENTE DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS. MINIMIZACIÓN DE FITOSANITARIOS DE SÍNTESIS QUÍMICA

I. CONCLUSIONES GENÉRICAS 2016/2019:

- Las trampas colocadas dentro de las PV de Confusión Sexual no han capturado adultos.
- Las trampas de las PV testigo han capturado entre 39 y 6 adultos/trampa, definiendo perfectamente el vuelo de adultos en las 3 generaciones.
- La no captura de machos en las trampas demuestra que la confusión existe.
- La difusión de la feromona ha sido suficiente hasta el final de la vendimia.
- Los bordes de las PV situadas al lado de PV sin confusión y/o bosque deben reforzarse adecuadamente.

B2. USO EFICIENTE DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS. MINIMIZACIÓN DE FITOSANITARIOS DE SÍNTESIS QUÍMICA

II. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 2016/2019:

- Años baja influencia
- Seguimiento por generación en todas las fincas
- Fincas control (vuelo mariposa)
- Finca control (Puesta de huevos)
- Una PV en Bellmunt del Priorat 2016 (Spinosad) 12%
- Una PV en El Lloar 2017 (Bacillus thuringiensis) 45%
- Ninguna PV en 2018
- Ninguna PV en 2019

Gracias por su atención

Más información:

www.lifeprioratmontsant.eu



MEJORA DE LA
SOSTENIBILIDAD VITIVINÍCOLA
DE LA COMARCA DEL PRIORAT

LIFE15 ENV/ES/000399

